

Ifylles och lämnas snarast  
till skolsköterskan

## VACCINATIONSTILLSTÅND

Tillstånd att mitt barn vaccineras med det kombinerade vaccinet mot  
difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Ja  Nej

Om nej, ange varför (frivilligt):

Datum och förälders/vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Telefon bostad

Telefon arbete/mobil

Datum och förälders/vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Telefon bostad

Telefon arbete/mobil

### Uppgifter om barnet

Namn

Personnummer

Skola

Klass/grupp

Har barnet fått vaccination mot difteri och stelkramp i samband  
med särskada (efter grundvaccinering på BVC)?

Ja (år:.....)  Nej

Har barnet någon svår allergi?

Ja  Nej

Om ja, ange vad:

Har barnet vid något tillfälle reagerat allergiskt mot  
tidigare vaccination och/eller injektion?

Ja  Nej

Om ja, ange vad:

Ta kontakt med skolsköterska eller skolläkare om Ditt barn har någon allvarlig  
och/eller långvarig sjukdom, svår allergi eller om Du har några frågor.

Skolsköterska

Telefon

Telefontid

Ifylles och lämnas snarast  
till skolsköterskan



**sanofi pasteur MSD**  
vacciner för livet

Hemvärnsgatan 15, Box 6023, 171 06 SOLNA

Tfn 08-564 888 60 Fax 08-564 888 70

www.spmsd.se

# Föräldrainformation om vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och *Haemophilus influenzae* typ b vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Skolan erbjuder Ditt barn (barn födda före 2002) under fjärde skolåret en påfyllnadsdos mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

## Varför vaccineras man mot dessa sjukdomar?

**Difteri** är en allvarlig epidemisk infektionssjukdom som har orsakat mindre utbrott i Sverige under senare årtionden och nyligen förekommit i närliggande länder. Sjukdomen kan leda till döden och därför är det viktigt att ha ett bra vaccinationsskydd.

**Stelkramp** är en infektionssjukdom som kan leda till döden. Stelkrampsbakterien förekommer i jord och smuts. Risk för infektion finns alltid vid förorenade sårskador, även vid små sår. Vaccination ger ett gott skydd mot sjukdomen.

**Kikhosta** är en smittsam luftvägssjukdom som kan ge en långvarig och svår hosta. Den är farlig, ibland t.o.m. livshotande för spädbarn, som oftast smittas av äldre syskon och/eller föräldrar. Äldre barn och vuxna som lider av kronisk luftvägssjukdom (t.ex. astma) kan få det extra besvärligt om de smittas av kikhosta.

**Polio** är en smittsam infektionssjukdom som kan orsaka s.k barnförlamning. Skadorna efter poliosjukdom är ofta bestående. Ett världsomspännande vaccinationsprogram har resulterat i att sjukdomen i det närmaste är utrotad. Dock är det mycket viktigt att ha ett fortsatt gott skydd vid vistelse i länder där polio ännu inte helt försvunnit.

## Varför ges en påfyllnadsdos?

För att förstärka och förlänga det grundskydd som gavs vid vaccination av Ditt barn på BVC ges nu en påfyllnadsdos av difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

## Ger vaccinationen några besvär?

Ditt barn kan komma att uppleva ömhet, värmeökning, rodnad och svullnad eller förhårdnad vid injektionsstället efter vaccinationen. Feber om  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , dåsighet, diarré, kräkning och irritabilitet kan förekomma. Dessa reaktioner är ofarliga och inträffar vanligen inom 48 timmar. De går i allmänhet över av sig självt på några dagar.

## Kan alla barn vaccineras?

Skolsköterskan bör informeras före vaccination om barnet har en känd systemisk överkänslighetsreaktion mot någon komponent i vaccinet. Barn med pågående infektion med feber skall vänta med vaccination.

Barn som efter tidigare vaccination har fått långvariga besvär med kliande upphöjda hudreaktioner bör informera skolsköterskan om detta före vaccination.

Om barnet råkat ut för någon typ av sårskada kan påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp ha givits på sjukhus eller vårdcentral, informera då skolsköterskan om detta före vaccination.

## Hur går det till?

Då vårdnadshavaren fyllt i blanketten och barnet återlämnat denna till skolsköterskan kommer ditt/ert barn att kallas till vaccination. Alla vacciner ges i en och samma spruta. Tala gärna med ditt barn före vaccinationen och förklara vad som skall hända, samt lugna barnet om det skulle behövas.

## När vaccinationen genomförts anteckna det i barnets hälsokort!